

漢方製剤

かんばくたいそうとう

甘麦大棗湯エキス〔細粒〕6

本方は、甘草、小麦、大棗で構成され、甘味があるので小児でも服用し易い薬です。感情が変動しやすく驚きやすい、寝つきが悪い、眠りが浅いなどの特徴があり、夜泣き、また神経過敏や興奮性でひきつけを呈するなどの急迫性の症状を目標とします。



●使用上の注意●



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

次の人は服用しないこと。

生後3ヵ月未満の乳児



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること。

(1)医師の治療を受けている人

(2)次の症状のある人 むくみ

(3)次の診断を受けた人 高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること。

(1)まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2)1週間位服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること。

●成分・分量●

本品3包(6.0g)又は6.0gは

〔カンゾウ……………2.5g ショウバク……………10.0g〕
〔タイソウ……………3.0g

甘麦大棗湯エキス2.6gを含有する細粒剤です。添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、乳糖、バレイショデンプン、香料を含有します。

●効能・効果●

夜なき、ひきつけ

●用法・用量●

次の量を1日3回、食前又は食間に服用してください。
(食間とは食後2～3時間を指します。)

年 齢	1 回 量	
	分包剤	大入り剤
7才未満4才以上	1 包	2.0 g
4才未満2才以上	2/3包	1.3 g
2才未満	1/2包	1.0 g 以下

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)7才未満の小児に限って服用させてください。
- (3)服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (4)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

●保管及び取扱い上の注意●

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わるため。)
- (4)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。効果には変わりありません。
- (5)分包剤で1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。

●お問い合わせ先●

松浦漢方株式会社 薬事学術部

TEL (052)883-5131 受付時間 10:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

発 売 元

松浦漢方株式会社
名古屋市昭和区円上町24-21

製造販売元

 **松浦漢方株式会社**
名古屋市緑区大高町寅新田36