

漢方製剤

五淋散料エキス[細粒]80

五淋の淋は、漢方では小便の渋ってポタポタとしたたるという意味を表し、また、五淋は熱淋、膏淋、血淋、石淋、砂淋という尿の出る具合とか症状を総括してつけられたものです。

●使用上の注意●

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

次の人は服用しないこと。

生後3カ月未満の乳児



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人
- (4) 高齢者
- (5) 次の症状のある人 むくみ
- (6) 次の診断を受けた人 高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること。

4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。

下痢

●成分・分量● 本品3包(6.0g)は

ブクリョウ.....	3.0g	ジオウ.....	1.5g
トウキ.....	1.5g	タクシャ.....	1.5g
オウゴン.....	1.5g	モクツウ.....	1.5g
カンゾウ.....	1.5g	カッセキ.....	1.5g
シャクヤク.....	1.0g	シャゼンシ.....	1.5g
サンシシ.....	1.0g		

五淋散料エキス5.2gを含有する細粒剤です。添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、結晶セルロース、乳糖、バレイショデンプン、香料を含有します。

●効能・効果●

頻尿、排尿痛、残尿感

●用法・用量●

次の量を1日3回、食前又は食間に服用してください。(食間とは食後2～3時間を指します。)

年 齢	1回量
大人(15才以上)	1包
15才未満7才以上	2/3包
7才未満4才以上	1/2包
4才未満2才以上	1/3包
2才未満	1/4包

(用法・用量に関連する注意)

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

●保管及び取扱い上の注意●

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わるため。)
- (4) 本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。効果には変わりありません。
- (5) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。

●お問い合わせ先●

発売元 松浦漢方株式会社 薬事学術部

TEL (052)883-5131 受付時間 10:00～17:00(土・日・祝日を除く)

発 売 元

松浦漢方株式会社
名古屋市昭和区円上町24-21

製造販売元

 松浦薬業株式会社
名古屋市緑区大高町東新田36