



服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

けい し ぶくりょう がんりょう

桂枝茯苓丸料 エキス細粒G「コタロー」

商品番号

D090

本剤は、のぼせやすく、足は逆に冷えるといった体質傾向（漢方という
おの 瘀血）の方に用いる処方です。

桂枝茯苓丸料エキス細粒G「コタロー」は、体力はかなりあるのに、生
理が不順であり、またつらい方、打撲すると内出血を起こす方、のぼせ
て足が冷え、肩こり、頭痛を訴える方に効果があります。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに
医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる） 等があらわれる。

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください

下痢

【効能・効果】

比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足
冷えなどを訴える次の諸症：
月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、めまい、頭
重、打ち身（打撲症）、しもやけ、しみ
※ 血の道とは、本来血液の通る血管のことで、月経時、更年期、産後など
の女性に見られる頭痛、めまい、精神不安などの諸症状を血の道症といい、
子宮関係の病気の俗称としても使われています。

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。
食間とは……食後2～3時間を指します。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	1包	3回
15歳未満 7歳以上	2/3包	
7歳未満 4歳以上	1/2包	
4歳未満	服用しないでください	

＜用法・用量に関連する注意＞

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてくだ
さい。

【成分・分量】

成分・分量 本剤3包（4.8g）中			
ケイヒ……………	3.20g	ボタンビ……………	3.20g
フクリョウ……………	3.20g	トウニン……………	3.20g
より抽出した水製エキス2.24gを含有しています。			

添加物としてステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖、プルラン、メタケイ酸アルミ
ン酸マグネシウムを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してくだ
さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。）
- (4) 水分が付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤って水
滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
- (5) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返し
て保管し、2日以内に服用してください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



【包装】

1.6g × 90包（30日分）

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがありますが、品質・
効果に変わりはありません。

製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06（6371）9106
受付時間 9：00～17：30（土、日、祝日を除く）