

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保管してください。



漢方製剤

ぼう ふう つう しょう さん

防風通聖散

エクス細粒G「コタロー」

商品番号

D003

防風通聖散エクス細粒G「コタロー」は、便秘を改善し、排尿、発汗を促して体内の老廃物を取り去る効果があります。これらにより体調を整え、脂肪が多い肥満体質を改善する処方です。

便秘がちで、特に腹部の皮下脂肪が厚い脂肪太りの方に用いられ、また同時に高血圧に伴う症状がある場合にも効果があります。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - (5) 発汗傾向の著しい人。
 - (6) 高齢者。
 - (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (8) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。

- (2) 1ヵ月位（便秘に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくならない場合

3. 長期連用する場合には、医師または薬剤師に相談してください
4. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください

下痢

【効能・効果】

腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症：
 高血圧の随伴症状（どうき、肩こり、のぼせ）、肥満症、むくみ、便秘

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。
 食間とは……食後2～3時間を指します。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	1包 または 2.4g	3回
15歳未満	服用しないでください	

（500g包装に添付のサジは、大が1.0g、小が0.1gの計量用となっております）


【成分・分量】

成分・分量 本剤3包（7.2g）中			
トウキ……………0.96g	ショウキョウ…0.24g	ビャクジュツ…1.60g	
シャクヤク…………0.96g	ケイガイ…………0.96g	キキョウ…………1.60g	
センキュウ…………0.96g	ボウフウ…………0.96g	オウゴン…………1.60g	
サンシシ……………0.96g	マオウ……………0.96g	カンゾウ…………1.60g	
レンギョウ…………0.96g	ダイオウ…………1.20g	セッコウ…………1.60g	
ハッカ……………0.96g	無水硫酸ナトリウム…0.56g	カッセキ…………2.40g	
より抽出した水製エキス4.80gを含有しています。			

添加物としてステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
 （誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。）
- (4)水分が付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
- (5)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
 （90包装のみ）
- (6)湿気などにより薬が変質することがありますので、服用後は、ビンのフタをよくしめてください。
 （500g包装のみ）
- (7)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



【包装】

2.4g×90包（30日分）
 500g

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。品質・効果に変わりはありません。

製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
 小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室
 大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106
 受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

漢方薬ガイド
 請求券



D003 WH1

左のシールをハガキに貼って、お買求めの店名、住所、氏名、年齢、職業、電話番号、症状をお書きそえのうえ、お申込みください。漢方薬と食養を詳しく説明した、パンフレットをお送りいたします。

製造販売元 漢方をよりよく より多くの人に



小太郎漢方製薬株式会社

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号
 TEL 06 (6371) 9106