

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保管してください。



第2類医薬品

いん ちん ご れい さん

漢方製剤

茵陳五苓散

エキス細粒G「コタロー」

商品番号

D052

口が渇き、尿量が減り、吐いたり、むくんだりする時によく用いられる漢方薬です。五苓散に茵陳蒿（カワラヨモギの花穂）を加えた処方であることから、五苓散（口渇と尿量減少）の病態に肝胆の炎症（熱）を伴ったものによいといわれています。

茵陳五苓散エキス細粒G「コタロー」は、お酒の飲み過ぎによる二日酔、むくみのほか、皮膚にあらわれるジンマ疹などにも用いられます。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

次の人は服用しないでください

生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 1ヵ月位（嘔吐、二日酔に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくなる場合

【効能・効果】

体力中等度以上をめやすとして、のどが渇いて、尿量が少ないものの次の諸症：

じんましん、二日酔、むくみ、嘔吐

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。

食間とは……食後2～3時間を指します。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	1包 または 1.5g	3回
15歳未満7歳以上	2/3包 または 1.0g	
7歳未満4歳以上	1/2包 または 0.75g	
4歳未満2歳以上	1/3包 または 0.5g	
2歳未満	1/4包 または 0.37g	

（大入り剤に添付のサジは、大が1.0g、小が0.1gの計量用となっております）

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

【成分・分量】

成分・分量 本剤3包(4.5g)中

タクシャ……………4.8g プクリョウ……………3.6g チョレイ……………3.6g
ビャクジュツ……………3.6g ケイヒ……………2.4g インチンコウ……………3.2g
より抽出した水製エキス3.40gを含有しています。

添加物として含水二酸化ケイ素、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプンを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) 水分が付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
- (5) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
(分包剤のみ)
- (6) 湿気などにより薬が変質することがありますので、服用後は、ビンのフタをよくしめてください。
(大入り剤のみ)
- (7) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (8) ビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。
(大入り剤のみ)



湿気注意

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。品質・効果に変わりはありません。

製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106
受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

漢方薬ガイド
請求券



D052 AP1

左のシールをハガキに貼って、お買求めの店名、住所、氏名、年齢、職業、電話番号、症状をお書きそえのうえ、お申込みください。漢方薬と食養を詳しく説明した、パンフレットをお送りいたします。

製造販売元 漢方をよりよく より多くの人に



小太郎漢方製薬株式会社

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号
TEL 06 (6371) 9106