

第2類医薬品

漢方製剤

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

けい がい れん ぎょう とう
荊芥連翹湯

エキス細粒G「コタロー」

商品番号

D334

中国の民間話話「白蛇伝」
に登場する女性を伝統的な
漢方のイメージとしてシン
ボルマークとしたものです。

本剤は、漢方の一貫堂・森道伯の経験にもとづいて創方された処方に準拠して
製造された漢方エキス細粒です。

蓄膿症やアレルギーによる鼻炎などがなかなか治らず、治療に通ったり、あき
らめたりといった具合で、「鼻」に悩んでおられる方が近年大変増えています。

漢方では、過敏な体质またはアレルギー体质で、粘膜・皮膚が外界の刺激に反
応しやすく、炎症反応を起こしやすい体质を解毒証体质と呼んでいますが、この
ような方は鼻症状を起こしやすく、また扁桃をしおちゅう腫らしたり、ニキビ
がなかなか治らなかったりします。

荊芥連翹湯エキス細粒G「コタロー」は、これらの症状を治していく漢方薬で
あります。また、同時に水分や脂肪分の摂取を控えるなど、食生活や生活習慣の改善
を心がけることも大切です。

**使用上の注意****してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください

生後3ヵ月未満の乳児。

**相談すること****1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください**

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。

**2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があります
ので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください**

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください**【効能・効果】**

体力中等度以上で、皮膚の色が浅黒く、ときに手足の裏に脂汗をかきやすく、腹壁が緊張しているものの次の諸症：
慢性鼻炎、慢性扁桃炎、蓄膿症（副鼻腔炎）、にきび

(裏面につづく)

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。
食間とは……食後2～3時間を指します。

年齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	1包 または 2.5g	3回
15歳未満7歳以上	2/3包 または 1.7g	
7歳未満4歳以上	1/2包 または 1.3g	
4歳未満2歳以上	1/3包 または 0.8g	
2歳未満	1/4包 または 0.6g	

（大入り剤に添付のサジは、大が1.0g、小が0.1gの計量用となっております）

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

【成分・分量】

成分・分量 本剤3包（7.5g）中					
トウキ	1.2g	オウバク	1.2g	キジツ	1.2g
シャクヤク	1.2g	サンシシ	1.2g	カンゾウ	0.8g
センキュウ	1.2g	レンギョウ	1.2g	ビャクシ	1.2g
ジオウ	1.2g	ケイガイ	1.2g	キキョウ	1.2g
オウレン	1.2g	ボウフウ	1.2g	サイコ	1.2g
オウゴン	1.2g	ハッカ	1.2g		
より抽出したエキス散5.6gを含有しています。					

添加物として含水二酸化ケイ素、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、アメ粉を含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) 水分が付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤つて水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
- (5) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
(分包剤のみ)
- (6) 湿気などにより薬が変質することがありますので、服用後は、ビンのフタをよくしめてください。
(大入り剤のみ)
- (7) 使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。
- (8) ビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。
(大入り剤のみ)



湿気注意

本剤は生薬を原料としていますので、商品により多少色が異なることがあります、品質・効果に変わりはありません。

商品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室

大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106

受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)



左のシールをハガキに貼って、お買求めの店名、住所、氏名、年齢、職業、電話番号、症状をお書きそえのうえ、お申込みください。漢方薬と食事詳しく説明した、パンフレットをお送りいたします。



製造販売元 漢方をよりよく より多くの人に
小太郎漢方製薬株式会社
〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号
TEL 06(6371)9106