

第2類医薬品

漢方製剤



中国の民間説話「白蛇伝」に登場する女性を伝統的な漢方のイメージとしてシンボルマークとしたものです。

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

ぞく めい とう 続 命 湯

エキス散「コタロー」

商品番号

D37C

本剤は、漢方の古典「きんぎょりやく金匱要略」(後漢時代)に収載の処方に準拠して製造された漢方エキス散です。

続命湯エキス散「コタロー」は、手足や顔面にしびれがあったり、言葉がもつれるなどの症状がある場合に用いられる漢方薬で、高血圧に伴う諸症状でお悩みの方に適用します。

また、神経痛、関節炎などの痛みやしびれを軽減し、むくみをとる効果もあります。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。

排尿困難

- (9) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感

3. 1ヵ月位(頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

【効能・効果】

言葉のもつれや手足の知覚がにぶり、しびれを伴う次の諸症：
高血圧に伴う症状（めまい、耳鳴り、頭痛、頭重、肩こり、頭部圧迫感）、
関節痛、神経痛、むくみ

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。
食間とは……食後2～3時間を指します。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	1包または2g	3回
15歳未満	服用しないでください	

（大入り剤に添付のサジは、大が1.0g、小が0.1gの計量用となっております）

【成分・分量】

成分・分量 本剤3包（6g）中		
トウキ	1.0g	キョウニン… 1.33g ケイヒ …… 1.0g
ニンジン	1.0g	セッコウ… 2.0g マオウ …… 1.0g
ショウキョウ	0.67g	センキュウ… 0.67g カンゾウ …… 0.67g

より抽出した水製エキス1.40gを含有しています。

添加物としてトウモロコシデンプン、乳糖水和物、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- (4)水分が付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
- (5)湿気などにより薬が変質することがありますので、服用後は、ビンのフタをよくしめてください。
（大入り剤のみ）
- (6)使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。
- (7)ビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。
（大入り剤のみ）



湿気注意

本剤は生薬を原料としていますので、商品により多少色が異なることがありますが、品質・効果に変わりはありません。

商品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106
受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

漢方薬ガイド
請求券



D37C A24

左のシールをハガキに貼って、お買求めの店名、住所、氏名、年齢、職業、電話番号、症状をお書きそえのうえ、お申込みください。漢方薬と食養生を詳しく説明した、パンフレットをお送りいたします。

製造販売元 漢方をよりよく より多くの人に



小太郎漢方製薬株式会社

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号
TEL 06 (6371) 9106