

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保管してください。



第2類医薬品

漢方製剤

サイケツト[®]S「コタロー」

さいこけいしとう
(柴胡桂枝湯エキス錠)

商品番号

S146

本剤は、漢方の古典「^{しょうかんろん}傷寒論」、^{きんきようりやく}「金匱要略」（いずれも後漢時代）収載の処方にもとづいてつくられたエキスを、飲みやすく錠剤としたものです。

漢方では、^{かぜ}風邪の手当ても体調や経過に応じて薬を選びますが、サイケツトSは、風邪の後期や、胃腸症状を伴う風邪に用いる漢方薬です。

スッキリ治りきらない風邪に用いるほか、微熱や頭痛があったり、^けはき気、腹痛といった胃腸症状を伴う場合にも効果があります。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
その他	頻尿、排尿痛、血尿、残尿感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）等があらわれる。

(2) 1ヵ月位（かぜの場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合

【効能・効果】

多くは腹痛を伴う胃腸炎、微熱・寒け・頭痛・はき気などのある感冒、風邪の後期の症状。

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。

食間とは……食後2～3時間を指します。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
大人（15歳以上）	3錠	3回
15歳未満5歳以上	2錠	
5歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】

成分・分量（本剤9錠中）		
サイコ……………2.50 g	ハンゲ……………2.00 g	ケイヒ……………1.25 g
シャクヤク……………1.25 g	オウゴン……………1.00 g	ニンジン……………1.00 g
タイソウ……………1.00 g	カンゾウ……………0.75 g	ショウキョウ……………0.50 g
より抽出した水製エキス1.75 gを含有しています。		

添加物として酸化チタン、ステアリン酸マグネシウム、タルク、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルメチルセルロース2910、粉末飴、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、カラメル、カルナウバロウ、サラシミツロウを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) めれた手や湿気を帯びた手で取り扱わないでください。水分は錠剤の色や形が変わる原因になります。
- (5) ビンのフタのしめ方が不十分な場合、湿気等の影響で錠剤の品質が変わることがありますので、服用のつどフタをよくしめてください。
- (6) ビンの中の詰めものは、フタをあけた後はすててください。
(詰めものは、輸送中に錠剤が破損することを防ぐためのものですので、再使用されると異物の混入や湿気により品質が変わる原因になることがあります)
- (7) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (8) 箱とビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。



【包装】

180錠 540錠

製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106
受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

製造販売元



漢方をよりよく より多くの人に

小太郎漢方製薬株式会社

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号
TEL 06 (6371) 9106