



第2類医薬品

漢方製剤

シギロン®「コタロー」

商品番号

S168

本剤は、漢方の古典「傷寒論」<sup>しょうかんろん</sup>（後漢時代）収載の処方にもとづいてつくられたエキスを、飲みやすく錠剤としたものです。

現代はストレス社会ともいわれますが、日常の精神的な緊張などから胃やおなかがキリキリ痛んだり、胸腹部が重くなるしくなる方が少なくありません。

シギロンは、このように胃腸機能が失調した状態にある方、あるいはおなかが痛んだり重くるといった方に用いられる漢方薬です。



### 使用上の注意



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。

#### 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください

1カ月位（胃炎、胃痛、腹痛に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合

### \*【効能・効果】

体力中等度以上で、胸腹部に重苦しさがあり、ときに不安、不眠などがあるものの次の諸症：  
胃炎、胃痛、腹痛、神経症

## 【用法・用量】

食前または食間に服用してください。

食間とは……食後2～3時間を指します。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
大人（15歳以上）	3錠	3回
15歳未満5歳以上	2錠	
5歳未満	服用しないでください	

## ＜用法・用量に関連する注意＞

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 【成分・分量】

成分・分量（本剤9錠中）			
サイコ……………	2.50 g	シクヤク……………2.00 g	キジツ……………1.00 g
カンゾウ……………	0.75 g		
より抽出した水製エキス1.25 gを含有しています。			

添加物として酸化チタン、ステアリン酸マグネシウム、タルク、乳糖水和物、ヒプロメロース、粉末飴、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、カルナウバロウ、サラシミツロウを含有しています。

## 【保管及び取扱い上の注意】


- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。

（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）

- (4) めれた手や湿気を帯びた手で取り扱わないでください。水分は錠剤の色や形が変わる原因になります。
- (5) ビンのフタのしめ方が不十分な場合、湿気等の影響で錠剤の品質が変わることがありますので、服用のつどフタをよくしめてください。
- (6) ビンの中の詰めものは、フタをあけた後はすててください。

（詰めものは、輸送中に錠剤が破損することを防ぐためのものですので、再使用されると異物の混入や湿気により品質が変わる原因になることがあります）

- (7) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (8) 箱とビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。



## 【包装】

180錠

製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。  
小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室  
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106  
受付時間 9:00～17:30（土、日、祝日を除く）

製造販売元



漢方をよりよく より多くの人に

**小太郎漢方製薬株式会社**

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号  
TEL 06 (6371) 9106