

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保管してください。



第2類医薬品

漢方製剤

ソケーカン[®]S「コタロー」

商品番号

S190

本剤は、漢方の古典「万病回春」^{まんびょうかいしゅん}（明代）収載の処方にもとづいてつくられたエキスを、飲みやすく錠剤としたものです。

四肢の関節や、腰から下あるいは肩、くび、腕などが痛み、時には腫^はれたり、しびれたりして日常生活に支障を来している方が少なくありません。

これらは時に夜間に痛みがひどくなったり、寒冷・湿気で悪化するなど、原因やあらわれ方もさまざまです。

ソケーカンSは、経^{けい}を疎^そし（気血^{きけつ}の道の通りをよくし）、血^{けつ}を活^いかして（血行をよくして）上記の症状を改善する薬です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

【効能・効果】

神経痛、腰痛、関節痛、筋肉痛。

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。

食間とは……食後2～3時間を指します。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
大人（15歳以上）	4錠	3回
15歳未満7歳以上	3錠	
7歳未満5歳以上	2錠	
5歳未満	服用しないでください	

【用法・用量に関連する注意】

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。


【成分・分量】

成分・分量（本剤12錠中）		
トウキ……………1.00 g	シャクヤク……………1.25 g	リュウタン……………0.75 g
ジオウ……………1.00 g	ゴシツ……………0.75 g	ショウキョウ……………0.50 g
ソウジュツ……………1.00 g	イレイセン……………0.75 g	チンピ……………0.75 g
センキュウ……………1.00 g	ボウイ……………0.75 g	ビャクシ……………0.75 g
トウニン……………1.00 g	ワキョウカツ……………0.75 g	カンゾウ……………0.50 g
ブクリョウ……………1.00 g	ボウフウ……………0.75 g	
より抽出した水製エキス3.60 gを含有しています。		

添加物として結晶セルロース、酸化チタン、ステアリン酸マグネシウム、タルク、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルメチルセルロース2910、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、カラメル、カルナウバロウ、サラシミツロウを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) ぬれた手や湿気を帯びた手で取り扱わないでください。水分は錠剤の色や形が変わる原因になります。
- (5) ピンのフタのしめ方が不十分な場合、湿気等の影響で錠剤の品質が変わることがありますので、服用のつどフタをよくしめてください。
- (6) ピンの中の詰めものは、フタをあけた後はすててください。
(詰めものは、輸送中に錠剤が破損することを防ぐためのものですので、再使用されると異物の混入や湿気により品質が変わる原因になることがあります)
- (7) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (8) 箱とピンの「開封年月日」記入欄に、ピンを開封した日付を記入してください。



【包装】

168錠 504錠

製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室

大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106

受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

製造販売元



漢方をよりよく より多くの人に

小太郎漢方製薬株式会社

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号

TEL 06 (6371) 9106