服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

中国の民間説話「白蛇伝」に登場する女性を伝統的な漢方のイメージとしてシンボルマークとしたものです。

第２類医薬品
漢方製剤

ボーツーン®N「コタロー」

商品番号
V003

本剤は、中国宋代の医書「宣明論（せんめいろん）」中風門に収載の処方にもとづいてつくられたエキスを、飲みやすく錠剤としたものです。

元気で、エネルギッシュな方でも、食生活の偏りや運動不足が続いたりすると、体の代謝機能が落ち、お腹を中心に皮下脂肪が多くたまり、便秘がち、といったことで体の不調を訴えるようになることが多いものです。

これは漢方では臓毒証（ぞうどくしょう）体質といって、高血圧などの生活習慣病にもつながりやすいものと考えています。

ボーツーンNは、便通、肥満を改善する漢方薬です。また、高血圧に伴う肩こりやのぼせなどにも効果があります。

使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1．本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください

他の瀉下薬（下剤）

2．授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

相談すること

1．次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください

(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦または妊娠していると思われる人。
(3)体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
(4)胃腸が弱く下痢しやすい人。
(5)発汗傾向の著しい人。
(6)高齢者。
(7)今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
(8)次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
(9)次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2．次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。

(2)１ヵ月位（便秘に服用する場合には１週間位）服用しても症状がよくならない場合

3．長期連用する場合には、医師または薬剤師に相談してください

4．次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください

下痢

（裏面につづく）

【効能・効果】

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症：
肥満症、高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症（副鼻腔炎）、湿疹・皮膚炎、ふきでもの（にきび）

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。
食間とは……食後2～3時間を指します。

年　齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	4錠	3回
15歳未満7歳以上	3錠	
7歳未満5歳以上	2錠	
5歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】

成分・分量（本剤12錠中）

トウキ……0.60ｇ	ショウキョウ……0.15ｇ	ビャクジュツ……1.00ｇ
シャクヤク……0.60ｇ	ケイガイ……0.60ｇ	キキョウ……1.00ｇ
センキュウ……0.60ｇ	ボウフウ……0.60ｇ	オウゴン……1.00ｇ
サンシシ……0.60ｇ	マオウ……0.60ｇ	カンゾウ……1.00ｇ
レンギョウ……0.60ｇ	ダイオウ……0.75ｇ	セッコウ……1.00ｇ
ハッカ……0.60ｇ	無水硫酸ナトリウム…0.35ｇ	カッセキ……1.50ｇ

より抽出したエキス散3.60ｇを含有しています。

添加物としてカルメロースカルシウム、含水二酸化ケイ素、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプンを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。
　（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
(4)ぬれた手や湿気を帯びた手で取り扱わないでください。水分は錠剤の色や形が変わる原因になります。
(5)ビンのフタのしめ方が不十分な場合、湿気等の影響で錠剤の品質が変わることがありますので、服用のつどフタをよくしめてください。
(6)ビンの中の詰めものは、フタをあけた後はすててください。
　（詰めものは、輸送中に錠剤が破損することを防ぐためのものですので、再使用されると異物の混入や湿気により品質が変わる原因になることがあります）
(7)使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。
(8)箱とビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。





湿気注意

副作用被害救済制度の問い合わせ先、リサイクルに関する情報を外箱に記載しています。
外箱の PRINTED WITH SOY INK は、外箱の印刷に環境に配慮した大豆油インキを使用していることを表しています。

本剤は生薬を原料としていますので、商品により多少色が異なることがありますが、品質・効果に変わりはありません。

商品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
小太郎漢方製薬株式会社　医薬事業部　お客様相談室
大阪市北区中津２丁目５番23号　TEL06（6371）9106
受付時間　9:00～17:30（土、日、祝日を除く）

Ⓡ登録商標

製造販売元
漢方をよりよく　より多くの人に
小太郎漢方製薬株式会社
〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号
TEL 06（6371）9106